

คู่มือการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วย

ที่ได้รับยาเคมีบำบัด



โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

คู่มือการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดน้ำย่อยที่สุด และสามารถทราบอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ และช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

“โปรดบันทึกข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ติดตามอาการผู้ป่วย
แนะนำให้เก็บรักษาคู่มือเล่มนี้อย่างดีและนำติดตัวไว้เสมอ”

บันทึกข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อ-สกุล _____

registration no. _____

อายุ _____ ปี เพศ _____ ว/พ/เกต _____

ที่อยู่ปัจจุบัน

เมอร์ติดต่อ _____

บุคคลใกล้ชิด _____ เกี่ยวข้องเป็น _____

เมอร์ติดต่อ _____

สถานที่ที่รับการรักษา _____

แพทย์เจ้าของไข้ _____

เมอร์ติดต่อ _____

ชื่อผู้ประสานงาน _____

เมอร์ติดต่อ _____

(หากเก็บเอกสารฉบับนี้ได้ กรุณาส่งคืนเจ้าของตามที่อยู่ที่ระบุไว้)

บันทึกข้อมูลการรักษา

โรคที่ได้รับการวินิจฉัย (Diagnosis)

ระยะของโรค:

แนวทางการรักษา

การผ่าตัด วันที่ _____

แพทย์ผู้รักษา :

การยาหั้งสี วันที่ _____

ตำแหน่ง : ขนาด :

การให้เคมีบำบัด เริ่มให้วันที่ _____

สูตรยา :

แพทย์ผู้รักษา :

ประวัติการแพ้ยา

ประวัติการได้รับเคมีบำบัด

บันทึกข้อมูลโรคประจำตัว

โรคประจำตัว	สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

รายการยาที่ใช้ประจำ

ชื่อยาและความแรง	ขนาดยาที่รับประทาน	สถานที่รับยา

ตารางบันทึกการรับยาเม็ดนำบด

(บันทึกช่วยจำ)

ครั้งที่รับยา	ช่วงวันที่รับยา (ว/ด/ป)	น้ำรับยาเม็ดนำบดครั้งล่าสุด(ว/ด/ป)	ยาเม็ดนำบดที่ได้รับ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

ตารางบันทึกการรับยาเม็ดนำบด

(บันทึกช่วยจำ)

ครั้งที่รับยา	ช่วงวันที่รับยา (ว/ด/ป)	น้ำรับยาเม็ดนำบดครั้งล่าสุด(ว/ด/ป)	ยาเม็ดนำบดที่ได้รับ
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

ประวัติการตรวจรักษา

วันที่	สูตรยาและน้ำบดที่ได้รับ	นัดครั้งต่อไป

10

บันทึกอาการข้างเคียง

วันที่	อาการข้างเคียงที่พบ	อุณหภูมิที่วัดได้เมื่อวาน (องค์ Celsius)

หมายเหตุ: อาจมีไข้ น้ำเหลือง มีอุณหภูมิในช่วงต่ำกว่า > 38 องศาเซลเซียส
หรืออุณหภูมิมากกว่า > 37.8 องศาเซลเซียส 11

ประวัติการตรวจรักษา

วันที่	สูตรยาเคมีบำบัดที่ได้รับ	นัดครั้งต่อไป

12

บันทึกอาการข้างเคียง

วันที่	อาการข้างเคียงที่พบ	จำนวนที่วัดได้เมื่อมาใช้ (องค์ความเชื่อมโยง)

หมายเหตุ: อาการไข้ น้ำเหลือง มีอุณหภูมิในช่องปาก > 38 องศาเซลเซียส
หรืออุณหภูมิร่างกาย > 37.8 องศาเซลเซียส 13

๓๔๙

สูตรยาเคมีบำบัด รักษาพยาบาลร่างกาย

พัฒนา

การพัฒนาแบบบูรณาการ

มาตรฐานการบริการ

ประวัติการตรวจรักษา

วันที่	สูตรยาเคมีบำบัดที่ได้รับ	นัดครั้งต่อไป

บันทึกอาการข้างเคียง

วันที่	อาการข้างเคียงที่พบ	อุณหภูมิที่ต้องมีไข้ (องศาเซลเซียส)

คุณรู้จัก “มะเร็ง” แค่ไหน ?

“มะเร็ง” โรคชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะของการแบ่งเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เซลล์จะทำการแบ่งตัวต่อไปจนพัฒนาขึ้น มีความสามารถที่จะลุกลามเข้าไปในเนื้อเยื่ออื่น ๆ โดยวิธีการไดวิธีการหนึ่ง เช่น เจริญเติบโตเข้าไปในเนื้อเยื่อชั้งเดียว (Invasion) หรืออพยพเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ๆ (Metastasis)

ทำอย่างไร ? เมื่อเป็นมะเร็ง

หากตรวจพบมะเร็งได้เร็วและรับการรักษาอย่างทันท่วงที จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากขึ้น หรือสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่หากรับการรักษาช้า อาจทำให้การรักษาเป็นไปได้ยากมากขึ้น

ทั้งนี้ การรักษาในปัจจุบันมีหลายวิธี เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัดหรือชอร์โนน การรักษาด้วยยาท่อออกฤทธิ์ระดับโมเลกุล เป็นต้น

สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยและญาติควรตั้งสติ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและวิธีการรักษา รวมทั้งการสร้างกำลังใจให้กับตัวผู้ป่วยเองและญาติผู้ดูแล

คุณรู้จัก เข้า แล้วหรือยัง ?

เคมีบำบัด (Chemotherapy)

ปัจจุบันยาเคมีบำบัดที่นำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งมีหลายชนิด โดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่อยู่ในร่างกาย แต่เนื่องจากยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์จำเพาะเฉพาะเซลล์มะเร็ง แต่เนื่องจากยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์จำเพาะเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้น หากยังส่งผลต่อเซลล์ปกติอื่น ๆ ในร่างกาย อีกด้วย จึงอาจส่งผลให้การทำงานของอวัยวะอื่น ๆ เกิดความผิดปกติ และเกิดอาการข้างเคียงขึ้นได้

ผลข้างเคียงแต่ละอาการอาจเกิดจำเพาะต่อยาแต่ละชนิด หรือขึ้นกับขนาดยาที่ใช้ รวมทั้งผู้ป่วยแต่ละคนอาจเกิดการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกัน ซึ่งผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตั้งกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน และรู้สึกห้อแท้ต่อการรักษาได้

แต่อาการข้างเคียงจากเคมีบำบัดเหล่านี้สามารถลดลงและบรรเทาหรืออาจป้องกันได้ ซึ่งนอกจากระเป็นหน้าที่ของแพทย์ ผู้รักษาแล้ว ผู้ป่วยหรือญาติผู้ดูแลสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไข หรือช่วยให้อาการข้างเคียงเหล่านั้นเบาบางลงได้

“เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โปรดศึกษาและทำความเข้าใจการปฏิบัติตนที่ถูกวิธีเมื่อต้องรับเคมีบำบัดตามข้อมูลที่แนะนำในคู่มือนี้”

การรักษาด้วย เศรษฐี บัด

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ✓ รักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค และไม่กลับเป็นซ้ำ
- ✓ ควบคุมก้อนมะเร็งให้มีขนาดเล็กลงหรือไม่โตมากขึ้น หรือไม่ให้เกิดการพร่องระยะจ่ายไปยังอวัยวะอื่น
- ✓ บรรเทาอาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร์อะราชายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การให้ยาเคมีบำบัดมีหลายวิธี เช่น การให้โดยวิธีรับประทาน การให้ยาชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ อย่างไรก็ได้ ผู้ป่วยอาจได้รับยาเคมีบำบัดหลายชนิดร่วมกัน ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเลือกสูตรยาและระยะเวลาในการรักษาตามชนิดของโรค และสภาพร่างกายของผู้ป่วย

เตรียมพร้อมก่อนรับ... เศรษฐี บัด

- ✓ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
- ✓ พักผ่อนให้เพียงพอและเพิ่มการนอนพักผ่อนในช่วงกลางวัน อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวัน
- ✓ แจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบ หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำ
- ✓ พยายามทำให้อารมณ์และจิตใจรู้สึกผ่อนคลาย เพื่อลดความกลัว ความวิตกกังวล และมีกำลังใจพร้อมรับการรักษา

การดูแลตนเองรับ... เศรษฐี บัด (กรณีได้รับยาฉีด)

- ✓ แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันทีเมื่อเกิดอาการดังต่อไปนี้
 - มีอาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดยา หรือสưngสิ้นว่ามีไข้ร้าชื้มออกนอกหลอดเลือด
 - มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
 - มีอาการแน่น หายใจไม่ออกร หน้าบวม ปากบวม
- ✓ ตื่นน้ำมากๆ เพื่อช่วยขับสารเคมีที่อาจตกค้างของการปัสสาวะ

ผลข้างเคียงของเคมีบำบัด และแนวทางปฏิบัติดน

1. อาการใช้

อาการใช้ หมายถึง การมีอุณหภูมิในช่องปาก > 38 องศาเซลเซียส (นานกว่า 1 ชั่วโมง) หรือมีอุณหภูมิรักแร้ > 37.8 องศาเซลเซียส

สาเหตุ “ใช้” อาจเป็นอาการนำของภาวะติดเชื้อ หรืออาการของโรคระบาด เช่น

ผู้ที่ได้รับเคมีบำบัดอาจพบภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำลง (ซึ่งเน็ตเลือดขาวมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ) ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นได้ สังเกตจากจะมีอาการใช้ หนาวสั่น ไอยิ่งพะโน่ในช่วง 7-14 วัน หลังรับยาเคมีบำบัด

ร้อป้องกันการติดเชื้อโดยทั่วไป

- ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
- คุ้มครองกายให้สะอาด อาบน้ำโดยใช้สบู่อ่อน ๆ เช่น สมุนไพร หากไม่พ้นปลอมควรรักษาความสะอาดหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง

- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นไข้หวัด วันโรค และไข้สั่น เป็นเดือน
- เมื่อออกจากจะมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนแยะอัด เช่น ตลาด โรงพยาบาล หรือห้างสรรพสินค้า เป็นเดือน

- หากถูกของมีคมบาด ให้รีบทำความสะอาดแผลและปิดด้วยผ้าพันแผล
- รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารสุก ๆ ดิน ๆ หรือของหมักดอง

- หลีกเลี่ยงการรับประทานพักสูด แนะนำให้ปรุงสุกก่อน และผลไม้ควรเป็นผลไม้ที่ปอกเปลือกออกได้ หรือผลไม้ที่ล้างให้สะอาดก่อนรับประทาน

- ควรเมืองร้อนมีเตอร์สำหรับวัดไข้ติดตัวไว้ ถ้าต่านสงสัยว่ามีไข้ควรติดอุณหภูมิร่างกายเพื่อยืนยันอาการ (แนะนำจดบันทึกอุณหภูมิและวันที่มีอาการไว้)

- หากมีอาการไข้ภายในหลังจากการได้รับยาเคมีบำบัด ให้รับมาพับแพทย์โดยด่วน

วิธีการปฏิบัติคนเมื่อมีใช้

รับมาพับแพทย์เพื่อตรวจเสื่อมคลื่นว่าเม็ดเลือดขาวต่ำหรือไม่ หากจำานวนเม็ดเลือดขาวต่ำควรรับเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที

2. โลหิตจาง

อาการ ตัวซื้ด หน้าซื้ด เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก มีน้ำร้าบ แต่ที่พ่นบ่อย คือ มีอาการอ่อนเพลีย

สาเหตุ เกิดจากเม็ดเลือดแตงโมจำนวนลดลง ซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดและภาวะของโรคมะเร็ง

วิธีบรรเทาอาการ

- รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมาก เช่น ตับ ผักใบเขียว อาหารที่มีโปรตีนและวิตามินสูง
- พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่หักโหม เช่น เปลี่ยนจากวิ่งมาเป็นเดินช้า ๆ และทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส
- ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามปกติ แต่ปรับให้เหมาะสมสมกับสภาพร่างกาย

วิธีการป้องกัน

รับมาพบนแพทาย และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

3. มีจุดเลือดหรือจ้ำเลือด

อาการ มีจุดเลือดหรือจ้ำเลือดขึ้นตามตัว เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน มีจุดแคงเล็ก ๆ ที่ตذاوا ล่าตัว แขน และขา หากเป็นแผลเลือดออก เลือดจะหยุดไหลได้ช้า แม้ว่าจะเป็นแผลขนาดเล็กก็ตาม


สาเหตุ เกิดจากจำนวนเม็ดเลือดต่ำ หลังได้รับยาเคมีบำบัด

วิธีป้องกันการเกิดแผลเลือดออกหรือบรรเทาอาการ

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดบาดแผล หรือเกิดการบาดเจ็บ เช่น ปั่นจักรยาน ขี่มอเตอร์ไซค์ ตัดไม้ฝ่าฟืน ตัดเย็บเสื้อผ้า หรือทำฟัน แนะนำให้สวมถุงมือทุกครั้งเวลาทำสวน หรืองานเกี่ยวครัว
- ใช้ที่โภนทวนไฟฟ้าแทนใบมีดโกน เพราะทำให้เกิดแผลน้อยกว่า รับมัคระวังการใช้ของมีคม
- ไม่ควรซื้อยากินเอง เช่น ยาสีฟัน ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อบางชนิด เพราะจะไปรบกวนการทำงานของเม็ดเลือด และอาจทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารได้
- งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

วิธีการป้องกัน

ถ้ามีเลือดออกมากผิดปกติให้รับมาพบนแพทาย



4. คลีนไส้ อาเจียน

อาการ อาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับยาหรือหลังรับยาแล้วนานเป็นวัน อาจรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่ในปาก เวลาเรออาจมีน้ำที่มีลักษณะเหลืองใสๆ และเบร์ยากอกรบกวนคัดคาย หรือป้องกัน

แพทย์มักจะให้ยาป้องกันการอาเจียนทั้งก่อนและหลังให้ยาเคมีบำบัด

วิธีบรรเทาอาการ

- รับประทานยาแก้คลีนได้อาเจียนตามแพทย์สั่ง
- อุญี่ปุ่นที่อาการคล้ายเดช จะช่วยบรรเทาอาการได้
- รับประทานอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ขนวนปัง

รับประทานที่คลายน้ำอ้อย แต่ป้องน้ำอ้อย

- รับประทานอาหารเหลว

ใส หรือเครื่องดื่มเย็นๆ เช่น

น้ำผลไม้ น้ำเชื่อม โดยใช้
หลอดดูดช่วย (น้ำเชื่อมมีรส
เผ็ดร้อน อาจเลือกหามีอาการ
เจ็บปากเจ็บคออยู่)

- หลีกเลี่ยงอาหารถูกนุน อาหารรสจัด อาหารมัน อาหารทอด
 เพราะจะกระตุนให้อาเจียนมากขึ้น

- หากมีอาการอาเจียนมากกว่า 3 ครั้งใน 1 ชั่วโมง หรืออาเจียนมาก
จนไม่สามารถรับประทานอาหารหรืออาหารได้ อาเจียนเป็นเลือด หรือมีน้ำดี
ปนออกมาน้ำ ก็มีอาการเหล่านี้ควรรับปรึกษาแพทย์ทันที



5. เจ็บปากเจ็บคอ

อาการ อาจมีแพลทหรือมีอาการปวดแสบ ปวดร้อนในปาก ช่องปากและเหงือกมีสีแดงเป็นมัน บวม และไวต่อความร้อนเย็นของอาหาร ริมฝีปากแห้ง มีเลือดออก มีฝ้าขาว มีหนอง หรือมีเมือกในปากมากขึ้น

วิธีบรรเทาอาการ

- อมน้ำแข็งหรือรับประทานไอศกรีม เพราะความเย็นจะช่วยบรรเทาอาการได้

- รับประทานอาหารอ่อน กลืนง่าย รสจืด ไม่ร้อนจัด เช่น น้ำซุป นม
เป็นต้น และอาจใช้หลอดดูดช่วย

- บดอาหารที่แข็งหรืออ่อนยากก่อนรับประทาน เช่น ขนวนปังกรอบ
- บัวบานกดด้วยน้ำเกลือ 2-3 ครั้งต่อวัน (ควรเลือกน้ำยาบัวบานปกติ
ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม)

- แปรงฟัน 2-3 ครั้งต่อวัน ด้วยแปรงสีฟันขนาดนุ่ม
- ทาเริมฝีปากให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอโดยด้วยลิปสติกมัน หรือวัสดุสีน้ำเงิน
- รักษาความชุ่มชื้นของเยื่อบุช่องปากอยู่เสมอ โดยต้มน้ำอย่างน้อย
วันละ 6-8 แก้ว

- งดสูบบุหรี่ งดเคี้ยวหูกะพูด และงดต้มศุรา

- เลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดหรือเปรี้ยว เช่น อาหาร
ประเภทกุ้ยช่าย ผลไม้ เช่น ส้ม มะนาว รวมถึงน้ำอัดลมด้วย

- หากมีแพลทรีเวนปาก หรือมีอาการเจ็บปากเจ็บคอรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ ควรรีบมาพบแพทย์

4. ห้องเสีย

๙ อาการ ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่าปกติ

๕. วิธีบรรเทาอาการ

- ๖. - ดื่มน้ำมาก ๆ อาจดื่มน้ำเกลือแร่ หรือน้ำชาจีนแทนได้
- รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก ไข่ เป็นต้น และอาหารที่ปูรุ่งสุก สะอาด
- รับประทานอาหารที่มีการไยน้อย เช่น กล้วย ข้าว ขนມปัง หรืออาหารเหลว เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงอาหารมัน เพศ กอต และอาหารที่มีการไยถุง เช่น ผัก และผลไม้สด เพราะจะกระตุนให้ห้องเสียน้ำมากขึ้น
- งดดื่มน้ำและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น โยเกิร์ต นมเบร์ย์ กาแฟใส่นม ไข่ และน้ำผลไม้ทุกชนิด
- ๗. - หลีกถ่ายอุจจาระเสร็จทุกครั้ง ให้ล้างท่าความสะอาดบริเวณทวารหนัก แล้วซับให้แห้ง
- ๘. - สังเกตผิวนังบวมบริเวณทวารหนักไว้แห้ง แดง แพก มีอาการเจ็บ
- ๙. มีเดือดออกปนมาบกบุจจาระ หรือมีไข้หรือไม่ ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบ ปรึกษาแพทย์
- ๑๐. - หากมีอาการรุนแรงมาก ควรรับมาพบแพทย์โดยด่วน ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง




7. ห้องผู้

อาการ ถ่ายอุจจาระลำบาก ต้องออกแรงเบ่งมาก เนื่องจากอุจจาระแห้งแข็ง ไม่ถ่ายอุจจาระตามเวลาที่เคยถ่าย หรือไม่ถ่ายอุจจาระติดต่อกัน 3 วัน

๕. วิธีบรรเทาอาการ

- รับประทานอาหารที่มีการไยให้มากขึ้น เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมเมือ
- ดื่มน้ำมาก ๆ อย่างน้อยวันละ ๘-๘ แก้ว อาจเป็นน้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำมะคูณ น้ำแตงโม และน้ำคูกพุด เป็นต้น
- ออกกำลังกายและหมั่นเคลื่อนไหวร่างกายตามความสามารถอย่าง สม่ำเสมอ
- ไม่แนะนำให้ใช้ยาสุนทรีย์เอง หากไม่ถ่ายอุจจาระเป็นเวลานาน หรือมีอาการรุนแรง เช่น ปวดเกร็งช่วงท้อง อุจจาระมีเลือดปน ให้รีบมาพบแพทย์





8. ผมร่าง

ยาเคลมีบำรัดบางชนิดอาจทำให้ผมร่างได้ แม้ไม่ต้องกังวล เมื่อจบการรักษา แล้ว ผมจะงอกขึ้นมาใหม่นะเอ้อ

วิธีบรรเทาอาการ

- ตัดผมนสัน จัดทำให้ถูกและง่าย และดูเหมือนมีผมนมากกว่า
- ใช้แซฟพูอ่อน ๆ เช่น แซมพูเด็ก
- ใช้แซฟชันนี่มี หรือซีฟาร์ ฯ และอย่าหัวผมนบ่อย
- ถ้าจำเป็นต้องใช้ที่เป่าผม ควรใช้คอมมอร์มต้า โน ไว้ล่อนร้อน
- ไม่ควรตัดหรือบ้มผมน เพราะน้ำยาตัดหรือบ้มน้ำยาบ้มผมนอาจระคายเคืองหนังศีรษะที่มีผมนปกคลุมอยู่
- อาจใช้น้ำมันเพิ่มความชุ่มชื้น หรือโลชั่นสำหรับหนังศีรษะ เพื่อช่วยลดอาการคันและแห้งของหนังศีรษะ
- อาจใช้วิธีรื้อผ้าคลุมผมนเพื่อเสริมบุคลิกภาพ

9. ผิวนังและเล็บเปลี่ยนสี

อาการ ผิวนังและเล็บแห้ง หายاب มีสะเก็ด มีสีดำคล้ำ อาการนี้จะเกิดขึ้น ช้าๆ นานๆ เนื่องจากยาที่จะหายไป

วิธีบรรเทาอาการ

- หลีกเลี่ยงการถูกแดดจ้า ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้าน 亙ว เสื้อแขนยาว 亙มานมาก หรือใช้ร่มเพื่อป้องกันแสงแดด
- ทาครีมหรือโลชั่นให้ผิวชุ่มชื้น เพื่อป้องกันผิวแห้งแตก
- เวลาเมื่ออาการคันผิวนัง ห้ามเกา ให้ถูกเบา ๆ ด้วยฝ่ามือ กด เป็น สัน หรือแกะง้อวัยรำแท่น
- ตัดเล็บให้สั้น และดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ




10. ฝ่ามือฝ่าเท้ามีสีแดงหรือดำคล้ำและเจ็บ

อาการ ฝ่ามือฝ่าเท้ามีสีแดง หรือดำคล้ำและเจ็บ อาการนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อทรายดยาแล้วจะหายไปเอง แต่อาจใช้เวลานาน

วิธีบรรเทาอาการ

- ประคบเย็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้า กรณีที่ความเย็นไม่มีผลกระตุ้นให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดที่ได้รับอยู่ (เช่น ถ้าได้รับยา Capecitabine อยู่ ต้องหลีกเลี่ยงความเย็น)
- ใช้โลชั่นบำรุงผิวจากฝ่ามือฝ่าเท้า
- สวมรองเท้าหุ้ม ฯ ไม่ดันเกินไป สามารถเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าอ่อนนุ่มนบางเบา
- หากฝ่ามือฝ่าเท้ามีอาการบวม แดง ผิวหนังลอกหรือเจ็บมาก ควรปรึกษาแพทย์



32



11. ชาปaley มือปลายเท้า

อาการนี้กักเป็นอยู่นาน สามารถกลับคืนเป็นปกติได้ แต่อาจใช้เวลานาน
วิธีบรรเทาอาการ

- หมั่นนวดหรือแซมมือเท้าในน้ำอุ่น จะช่วยบรรเทาอาการได้
- ออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ
- ปรึกษาแพทย์เพื่อรับวิตามิน หรือยานบรรเทาอาการ
- รวมตัวร่วงการยืนยันของมีคุณ ของร้อน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
- หากมีอาการรุนแรงมากจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ควรรับปรึกษาแพทย์

33

12. ความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์และการมีบุตรคล่อง
ยาเคมีบำบัดบางชนิดอาจมีผลต่อการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์ ทั้งยังขึ้นอยู่กับอายุและสภาพร่างกายทั่วไปของผู้ป่วยด้วย

เพศชาย

- ผู้หนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์อาจมีอาการคัน แห้ง เจ็บ ทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้ยาก อาจใช้ครีมหล่อเลี้ยงช่วย
- ยาเคมีบำบัดอาจมีผลต่อการผลิตอสุจิ และความสามารถในการเคลื่อนไหวของอสุจิ จึงอาจทำให้มีลูกยากในผู้ป่วยที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนครอบครัว
- ควรคุยกันนิดโดยการใช้ถุงยางอนามัย

เพศหญิง

- ช่องคลอดอาจมีอาการแห้ง ทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้ยากหรือเจ็บ อาจใช้ครีมหล่อเลี้ยงช่วย
- ยาเคมีบำบัดอาจมีผลต่อรังไข่ และอาจทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ จึงอาจทำให้มีลูกยาก
- ในผู้ป่วยที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนครอบครัว
- ควรคุยกันนิดในระหว่างให้ยาเคมีบำบัด และหลังให้ยาครบแล้วอย่างน้อย ๖ เดือน เพราะยาเคมีบำบัดหลายชนิดอาจมีอันตรายต่อการกำเนิดครรภ์




13. อารมณ์

สาเหตุ อาจมีอารมณ์แปรปรวน หรือมีความกังวลสูง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการหื่นหรือยาแก้ได้

วิธีบรรเทาอาการ

- ควรจะทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส ไม่ห้อโถอยต่อการรักษา ทำความเข้าใจเสมอว่า อาการซ้ำๆ คือการเตือนที่เกิดขึ้นจะหายไปเมื่อจบการรักษาแล้ว
- ญาติควรเอ่ยให้สุนทรีย์ พูดคุยให้กำลังใจอยู่เสมอ
- หากจิตประจวบตามปกติ แต่ปรับกิจกรรมที่ทำให้เหนื่อยล้า กับสภาพร่างกายของตน
- พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- ทำงานอดิเรกทำ หรือกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจ เช่น พัฒนาสิ่งของ งานอดิเรก หรือศูนย์การเรียนรู้ที่ชอบ



ท่านควรรับมาพบรแพทย์ทันที ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ (รับไปสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด)

- ไข้สูง (วัดอุณหภูมิ > 38 องศาเซลเซียส) ร่วมกับอาการ寒าน้ำเล็กน้อย
เฉพาะในช่วง 7-14 วันหลังรับยาเคมีบำบัด
- ผื่นแดงมาก หน้ามีดี ใจสั่น อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ สูญเสียการทรงตัว
- แขนขา疼ที่ให้ยาเคมีบำบัดมีอาการบวม แดง ร้อน แสบ หรือค่าคล้ำ
- เยื่อบุช่องปากเป็นแผลและอักเสบรุนแรง หรือเชื้อร้ายในช่องปาก
- มีจุกเลือดจ้ำเลือดข้นตามตัว หรือมีเลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดาไหล
มีจุกแดงที่ตาช้ำ ลำตัว แขน และขา มีฝืน หรือคุ้มขึ้นความร่างกาย
- ปัสสาวะมีเลือดปน เจ็บเวลาปัสสาวะ หรือปัสสาวะไม่ออกร้ายใน 8 ชั่วโมง
- อาการข้างเคียงต่าง ๆ มีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ศีรษะ疼 เจ็บปัสสาวะ
รุนแรง ท้องเสียรุนแรง ปวดศีรษะรุนแรง
- น้ำหนักเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างรวดเร็ว

บันทึกเพิ่มเติม
